

การพยาบาลผู้ป่วยเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนบนที่มีภาวะช็อก: กรณีศึกษาโรงพยาบาลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ขวัญเรียม เสี่ยมศักดิ์, พย.บ.¹

บทคัดย่อ

ภาวะตกเลือดในระบบทางเดินอาหารส่วนบนเป็นภาวะฉุกเฉินทางเวชปฏิบัติซึ่งการดูแลรักษาผู้รับบริการที่มีภาวะตกเลือดในระบบทางเดินอาหารส่วนบน ต้องอาศัยความร่วมมือทางทีมแพทย์พยาบาล เนื่องจากภาวะตกเลือดในระบบทางเดินอาหารส่วนบน เป็นภาวะวิกฤตที่ทำให้ผู้รับบริการเสียเลือดจนเกิดภาวะช็อกและเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงซึ่งเป็นสาเหตุของการทำให้เสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการวินิจฉัยและการดูแลรักษาที่ถูกต้องรวดเร็ว ผู้วิจัยได้ศึกษาผู้รับบริการรักษาในโรงพยาบาลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน 2566 ที่มีภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนบนที่มีภาวะช็อกจำนวน 2 รายโดยการศึกษาข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วยใน การซักประวัติ ผู้ป่วยและญาติ การสังเกตการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ แบบแผนสุขภาพ 11 แบบแผนของกอร์ดอน พยาธิสภาพ อาการและอาการแสดง การรักษาภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนต้น ปัญหาและข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล การพยาบาลในระยะวิกฤต ระยะต่อเนื่อง และระยะการวางแผนจำหน่าย พบว่า ภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนต้น นับเป็นภาวะวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจอย่างรวดเร็ว พยาบาลต้องสามารถประเมินและดูแลผู้ป่วยได้ตั้งแต่แรกรับเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อชีวิตของผู้ป่วยการดูแลเบื้องต้นจากโรงพยาบาลชุมชนที่เหมาะสมรวมถึงการประสานส่งต่อที่ถูกต้องเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่จะสามารถให้การดูแลรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นผู้ป่วยได้รับการรักษาในหน่วยวิกฤต ซึ่งมีอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจที่มีความพร้อมและทันสมัย มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญผ่านการอบรมเฉพาะทางทำให้สามารถรักษาพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เหมาะสม ทันท่วงทีภาวะการณเจ็บป่วย ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน

คำสำคัญ : ภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนบน, ช็อกจากการเสียเลือด, การพยาบาล

¹พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ E-mail: kawanream2514@gmail.com

Nursing care for patients with upper gastrointestinal bleeding with shock Khun Han Hospital ,Khun Han District, Sisaket Province

Kawanream sangeamsak, *B.N.S.*¹

Abstract

Upper gastrointestinal hemorrhage is a medical emergency in which patients with upper gastrointestinal hemorrhage are treated. This requires the cooperation of a team of doctors and nurses because hemorrhage in the upper gastrointestinal tract is a critical condition that causes the patient to lose blood leading to shock and hypothermia. Severe complications can lead to death if not diagnosed and treated promptly. We studied two patients treated in Khun Han Hospital in Sisaket province between August and September 2023 with shock upper gastrointestinal bleeding by studying medical records. Inpatient history taking, patients and relatives Observation Comparative Data Analysis Gordon's 11 Health Schemes Pathology Symptoms and signs Treatment of bleeding in the upper gastrointestinal tract Nursing problems and diagnoses Nursing care in the critical, continuous, and discharge planning phases showed that bleeding in the upper gastrointestinal tract. It is a crisis that has rapid physical and psychological consequences. Nurses must be able to assess and care for patients at the outset to prevent risks to the patient's life. Proper primary care from community hospitals, as well as the correct coordination of referrals, are one of the key factors to be able to provide effective care. In addition, patients are treated in intensive care units, equipped with modern and equipped ventilators. There are specialized personnel who have undergone specialized training, enabling fast, accurate, and appropriate medical treatment in a timely manner in the event of illness and safe from complications.

Keywords: upper gastrointestinal bleeding, shock from blood loss, Nursing care

¹Registered Nurse Professional Level. Khun Han Hospital ,Khun Han District, Sisaket Province kawanream2514@gmail.com