

## การพยาบาลผู้ป่วยเสพยาบ้าที่มีพฤติกรรมรุนแรง : กรณีศึกษา 2 ราย

บุญโขม ทิพย์สมบัติ, ป.พย.<sup>1</sup>.

### บทคัดย่อ

การศึกษารั้งนี้ เป็นการศึกษาเปรียบเทียบการพยาบาลผู้ป่วยเสพยาบ้าที่มีพฤติกรรมรุนแรงจำนวน 2 ราย ที่เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาลบึงบูรพ์ ในช่วงเวลาระหว่าง 10 พฤศจิกายน 2566 – 11 มกราคม 2567 ศึกษาด้วยการประเมินภาวะสุขภาพตามแบบแผนของกอร์ดอน การใช้กระบวนการพยาบาล 5 ขั้นตอน และทฤษฎีทางการพยาบาลที่เกี่ยวข้อง ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบทั้ง 2 รายเสพยาบ้ามีพฤติกรรมรุนแรงระดับสูง โดยรายที่ 1 เป็นชายไทย อายุ 33 ปี มีพฤติกรรมทำร้ายบุคคลอื่น รายที่ 2 เป็นชายไทยอายุ 18 ปี มีพฤติกรรมทำร้ายตนเอง ทั้ง 2 ราย ได้รับการรักษาด้วยยาต้านโรคจิตและยาควบคุมอารมณ์เมื่อถูกจับ การสร้างสัมพันธภาพและการให้คำปรึกษา ทั้งผู้ป่วยและญาติ เกิดความไว้วางใจและยอมรับในตัวผู้ป่วย เพื่อให้สามารถจดจำผู้ป่วยกลับไปอยู่กับครอบครัวได้ หลังจากการรักษาพบว่า กรณีศึกษาทั้ง 2 ราย ยังควบคุมอารมณ์ได้น้อย มีความเสี่ยงที่จะกลับไปเสพยาเสพติดและ มีพฤติกรรมรุนแรงซ้ำอีก จากปัจจัยบุคคลิกภาพที่ผิดปกติที่มีผลจากยาเสพติด การถูกครอบครัวปฏิเสธและการกลับไปอยู่ ในชุมชนที่มียาเสพติด ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องส่งต่อให้ภาคีเครือข่ายเข้าร่วมการดูแล ผู้ประวัติอย่างต่อเนื่องและ ป้องกันการก่อความรุนแรงซ้ำ

**คำสำคัญ:** การพยาบาลผู้ป่วยเสพยาบ้า, พฤติกรรมรุนแรง

<sup>1</sup> พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ Email : mudmee2005@gmail.com

## Nursing care of patients with amphetamine addiction who have Violent behavior : 2 case studies

Boonhom Thipsombat,*Dip in N.EQU BN.*<sup>1</sup>

### Abstract

This case study was a comparative study of nursing care for 2 violent methamphetamine addicts who were admitted as inpatients at Buengbun Hospital during November 10, 2023, and January 11, 2024. This case study used Gordon's health assessment model, including the 5-step nursing process and related nursing theories.

The results of the comparative study showed that both methamphetamine addicts had a high level of violent behavior. Case 1 was a 33-year-old, Thai male who had a history of harming others. Case 2 was an 18-year-old, Thai male who had repeated self-harm. Both patients received the same antipsychotic and mood stabilizer treatment. Relationship building and counseling were conducted for both patients and relatives, resulting in trust and acceptance of the patients so that they could be discharged back home to their families. After treatment, it was found that both cases still had poor emotional control and were at risk of returning to narcotic use, addiction, and violent behavior. Due to abnormal personality factors resulting from narcotics, family rejection, and returning to a community with narcotics, it was necessary to refer them to network partners to participate in continuous care, monitoring, and prevention of recurrence of violence.

**KEYWORDS:** Nursing care for patients addicted to methamphetamine , violent behavior

---

<sup>1</sup> Registered Nurse, Professional level, Buengbun Hospital, Sisaket Province Email: mudmee2005@gmail.com